

DEUX-SEVRES AMENAGEMENT ZAC BATIPOLIS

Cahier des charges de cession de terrains

Annexe 3

**Cahier des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères
et environnementales**

PALETTE VEGETALE




Traces

GE d'urbanisme & paysage

■ CONSEILS POUR LA PLANTATION

▪ Tuteurs

Les arbres seront tuteurés, avec des tripodes pour les arbres de taille 16/18 ou plus, avec des bipodes pour les autres tailles d'arbre.



▪ Paillage

Toutes les plantations (arbres, arbustes, haies, massifs) seront pourvues au moment de la plantation, à leur pied, d'un paillage en écorce de bois d'une épaisseur minimum de 20cm. Sur les talus une toile non tissée en fibre végétale sera installée avant plantation.

Cette mesure permet de minimiser l'entretien en réduisant les arrosages et en empêchant les mauvaises herbes de pousser.

▪ Entretien

Une gestion différenciée est conseillée pour l'entretien des espaces verts. Ce mode de gestion consiste à pratiquer un entretien adapté des espaces verts selon leurs caractéristiques et leurs usages. Il s'agit de faire le bon entretien au bon endroit.

Par exemple, les bandes enherbées bénéficieront d'une fauche tardive au lieu d'une tonte régulière afin de favoriser la biodiversité (2 fauches : 1 avant le 1^{er} mai si besoin et 1 fauche tardive après le 1^{er} septembre).

Les bandes enherbées pourront également être remplacées par des prairies fleuries, qui demandent très peu d'entretien et embellissent les espaces verts.

La taille des arbres et arbustes se fera à la fin de l'hiver, ce qui permet de conserver le plus longtemps possible les baies des arbustes. La taille sera réalisée avant la nidification des oiseaux. La taille d'hiver sera réalisée pendant la période de dormance de l'arbre et en dehors des périodes de gel.

Les produits phytosanitaires (herbicides, pesticides) sont proscrits. Le désherbage sera mécanique ou thermique. Si des engrais doivent être utilisés, ils seront de nature organique et non chimique.

Les systèmes d'arrosage automatique sont déconseillés, sauf s'ils sont reliés à un système de récupération des eaux de toitures. Il sera choisit des espèces (gazons, arbres, arbustes) adaptées au risque de sécheresse.

Les arbres et plants morts seront remplacés.

■ COMPOSITION D'UNE HAIE CHAMPÊTRE

Une haie champêtre est composée des plusieurs espèces de végétaux d'essences indigènes adaptées au terrain, au climat et donc plus résistantes aux attaques parasitaires. Elles sont plus faciles d'entretien et offrent de nombreux avantages :

- **Embellie le cadre de vie et de travail**
- **Maîtrise du ruissellement pluvial et conservation des sols** : favorisant l'infiltration de l'eau grâce à leurs racines, et l'évapotranspiration grâce à leur feuillage, les haies contribuent à diminuer et freiner les ruissellements.
- **Brise-vent** : les haies protègent contre les bourrasques (bâtiments, aires de stockage, aires de stationnement,.....)
- **Confinement des pollutions** : les haies captent et contribuent à dégrader les polluants véhiculés par les eaux de ruissellement.
- **Sauvegarde de la biodiversité** : les haies constituent d'indispensables refuges pour de nombreuses espèces animales et végétales. Elles forment des "corridors écologiques" permettant les déplacements de certaines espèces et le brassage génétique des populations. Les haies champêtres sont le refuge d'une multitude d'animaux. Elles jouent un rôle important dans la nidification des oiseaux.



Pour qu'une haie soit efficace en termes esthétiques et écologiques, elle doit satisfaire à certains critères :

- haie **diversifiée** (l'idéal : une quinzaine d'espèces) avec une base d'essences autochtones (adaptées au sol et au climat) pour permettre une intégration dans l'écosystème environnant,
- **largeur suffisante** (si possible plus de 3 mètres),
- densité élevée (1 arbuste/mètre linéaire),
- base garnie de plantes herbacées,
- **connexion** avec d'autres sources de biodiversité : autre haie, bois, bosquet, zone humide, friche,...
- **entretien adapté** : pas de désherbage au pied d'une haie développée, maîtrise des essences envahissantes au moyen de la taille,
- conservation des arbres morts (sauf ceux qui peuvent être dangereux par leur chute),
- **planter de manière aléatoire** ou par îlot d'une même espèce, plutôt qu'en alternant régulièrement les espèces,
- laisser se développer les drageons et les semis naturels de la haie.

Exemple de composition d'une haie avec des espèces choisies dans la palette végétale :

- Amélanchier (*Amelanchier canadensis*)
- Aubépine blanche (*Crataegus laevigata*)
- Charme commun (*Carpinus betulus*)
- Chêne pédonculé (*Quercus robur*)
- Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*)
- Eglantier (*Rosa canina*)
- Epine noire (*Prunus spinosa*)
- Erable champêtre (*Acer campestre*)
- Frêne commun (*Fraxinus excelsior*)
- Fusain d'Europe (*Euonymus europaeus*)
- Merisier (*Prunus avium*)
- Noisetier commun (*Corylus avellana*)
- Sureau noir (*Sambucus nigra*)
- Troène (*Ligustrum*)
- Viorne cotonneuse (*Viburnum lantana*)



■ LES HAIES ET LA LOI

En France, les plantations de voisinage sont soumises à une réglementation définie par le code civil :

- **D'après l'article 671 du code civil :**

« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. »

- **D'après l'article 672 du code civil :**

*« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. »*



ARBRES Grande taille 20 - 30 m

Genre		Dimension	Feuillage et port	Floraison	Exposition	Entretien
ACER platanoides Erable plane		H. 25 m L. 15 m	Feuillage caduc Arbre vigoureux, à larges feuilles ovales, vert sombre, virant au jaune pâle, parfois au rouge en automne.	Petites corymbes dressées de fleurs jaunes.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, même calcaire, frais.	TAILLE (Janvier Novembre-Décembre) De la fin de l'automne au milieu de l'hiver, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
AESCULUS hippocastanus Marronnier commun		H. 25 m L. 20 m	Arbre vigoureux à port étalé et à larges feuilles palmées. Feuillage caduc	En avril - mai, floraison en grandes panicules de fleurs blanches marquées de jaune au printemps. Les marrons apparaissent en fin d'été.	Exposition au soleil. Sol ordinaire, humifère, frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.	Taille (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
CELTIS australis Micocoulier de Provence		H. 20 m L. 20 m	Feuillage caduc Arbre à port élégant. . Port étalé.	Septembre-Octobre : produit de petits fruits rouges comestibles.	Assez rustique, jusqu'à -10°C. Exposition au soleil. Sol léger, sec à modérément humide.	Taille (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
CARPINUS betulus Charme commun		H: 25 m Diam : 20 m	Arbre à cime ronde ou ovoïde. Feuilles ovales vert moyen, devenant jaune orangé en automne et restant sur les rameaux, jusqu'à la fin de l'hiver. Feuillage semi-persistant		Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, frais à humide.	TAILLE (Août-Septembre) en haie. Supporte une taille sévère.

ARBRES Grande taille 20 - 30 m

Genre		Dimension	Feuillage et port	Floraison	Exposition	Entretien
FRAXINUS excelsior Frêne commun		H. 30m L. 20 m	Feuillage caduc. Feuilles composées de 9-13 folioles lancéolées, devenant jaune en automne	Arbre à gros bourgeons noirs et écorce lisse, puis fendillée.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil. Sol ordinaire, même calcaire, frais.	Taille (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
JUGLANS regia Noyer commun		H: 30 m Diam : 15 m	Feuillage caduc Arbre à port majestueux, pouvant atteindre plus de 20 m de haut, devenant centenaire et intéressant à la fois pour sa fructification, les noix, et la qualité de son bois.	Fruits comestibles	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil. Sol ordinaire, pas trop sec à frais.	TAILLE (Août-Septembre) tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port. La taille doit être pratiquée en fin d'été pour éviter les écoulements de sève.
LIRIODENDRON tulipifera Tulipier de Virginie		H: 30 m L: 15 m	Cet arbre, à croissance rapide, pouvant atteindre 50 m dans son milieu naturel, a des feuilles caractéristiques, lobées, à extrémité tronquée.	En Juillet-Août les fleurs en forme de tulipe sont jaune verdâtre avec une base orangé.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, sans trop de calcaire, frais à humide.	TAILLE Craint les élagages trop importants.
PRUNUS avium Merisier		H. 20 m L. 10 m	Feuillage caduc Arbre à port étalé	En avril, Il se couvre de fleurs en coupe, blanches . C'est le cerisier sauvage qui produit de petites cerises, appelées aussi merises.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil. Sol ordinaire, pas trop sec à frais.	TAILLE (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.

ARBRES Grande taille 20 - 30 m

Genre		Dimension	Feuillage et port	Floraison	Exposition	Entretien
<p>QUERCUS palustris</p> <p>Chêne des marais</p>		<p>H: 20 m</p> <p>L: 12 m</p>	<p>Feuillage caduc. Arbre de croissance rapide, aux branches inférieures pendantes. Ses feuilles sont profondément lobées, vert moyen lustré. Elles portent de grandes touffes de poils dans l'axe des nervures et deviennent écarlates au brun-rouge en automne.</p>	<p>Ses glands sont pratiquement sphériques.</p>	<p>Exposition au soleil. Sol léger, acide (non calcaire), pas trop sec à frais.</p> <p>Rustique, au moins jusqu'à -15°C.</p>	<p>TAILLE (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.</p>
<p>QUERCUS pubescent</p> <p>Chêne blanc</p>		<p>H: 20 m</p> <p>L: 10 m</p>	<p>Feuillage marcescent</p> <p>Port dressé puis étalé</p> <p>feuilles alternes, glabres dessus, pubescentes-tomenteuses dessous</p>		<p>Rustique</p> <p>exposition au soleil, sol bien drainé supporte le calcaire.</p> <p>chêne truffier du Sud-Ouest de la France, mais présent dans toute l'Europe méridionale, en Asie occidentale, et au Caucase</p>	
<p>QUERCUS robur</p> <p>Chêne pédonculé</p>		<p>H: 35 m</p> <p>L: 25 m</p>	<p>C'est le chêne de nos forêts d'Europe. Ses feuilles, vert foncé, sont plus ou moins profondément lobées et ses glands sont très appréciés des animaux.</p> <p>Feuillage caduc</p>		<p>Rustique, au moins jusqu'à -20°C.</p> <p>Exposition au soleil. Sol ordinaire, sans trop de calcaire, pas trop sec à frais.</p>	<p>TAILLE (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.</p>

ARBRES Moyenne taille 12 - 20 m

Genre		Dimension	Feuillage et port	Floraison	Exposition	Entretien
ACER pseudoplatanus Erable sycomore		H. 30 m L. 15 m	Arbre à feuilles caractéristiques à 5 lobes. Croissance rapide.		Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil. Sol ordinaire, humifère, pas trop sec à frais.	TAILLE (Janvier Novembre-Décembre) De la fin de l'automne au milieu de l'hiver, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
BETULA utilis Bouleau commun		H. 18m L. 10m	Feuilles caduques Arbre élégant à la ramification ouverte, avec une écorce blanc éclatant. Feuilles caduques ovales à bord en dents-de-scie, virant au jaune clair en automne.	En Avril chatons femelles jusqu'à 12 cm de long.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil. Sol léger, frais.	TAILLE (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
DAVIDIA involucrata Arbre à mouchoirs		H. 15m L. 10 m	Feuillage caduc Arbre à feuilles vert vif, feutrées en dessous. Superbes couleurs des feuilles en automne.	En Mai - Juin l'arbre adulte porte de grandes bractées blanches.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, frais à humide.	Taille (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
FRAXINUS ORNUS Frêne à fleur		H: 15 m L: 15 m	Feuillage caduc Arbre à cime touffue et rameaux rougeâtres, ponctués de jaune. Feuilles rouge pourpré en automne.	En mai fleurs parfumées, blanches en panicules compactes.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil. Sol ordinaire, même calcaire, frais.	Taille (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.

ARBRES moyenne taille 12 - 20 m

Genre		Dimension	Feuillage et port	Floraison	Exposition	Entretien
PRUNUS avium Merisier		H. 20 m L. 10 m	Feuillage caduc Arbre à port étalé	En avril, Il se couvre de fleurs en coupe, blanches . C'est le cerisier sauvage qui produit de petites cerises, appelées aussi merises.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil. Sol ordinaire, pas trop sec à frais.	TAILLE (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
PRUNUS mahaleb Cerisier de Sainte Lucie		H. 10 m L. 8 m	Feuillage caduc Arbre étalé, gracieux,	En mai multitude de fleurs blanches, très parfumées, suivies de petits fruits d'abord rouges, puis noirs.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil. Sol ordinaire, pas trop sec à frais.	TAILLE (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
PYRUS calleryana 'Chanticleer' Poirier ornementale 'Chanticleer'		H: 15 m L. 6 m	Arbre à port conique étroit à feuilles lustrées devenant rouge en automne. Feuillage caduc	Il se couvre d'ombelles de fleurs blanches d'avril à mai et produit des petits fruits bruns.	Exposition au soleil. Sol ordinaire, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -20°C.	TAILLE (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
SORBUS aria 'Lutescens' Alisier blanc		H: 15 m L. 8 m	feuillage caduc Port évasé, couronne large conique, feuilles avec une fine pellicule duveteuse argenté, gris vert en fin d'été.	Sa floraison blanche printanière et sa fructification automnale rouge orangé sont déjà deux atouts importants.	Exposition au soleil. Sol léger, pauvre, même calcaire, plutôt sec. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.	TAILLE (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.

ARBRES moyenne taille 12 - 20 m

Genre		Dimension	Feuillage et port	Floraison	Exposition	Entretien
<p>TILIA cordata Tilleul à petites fleurs</p>		<p>H. 25 m L. 15 m</p>	<p>Ce grand arbre est un classique dans nos parcs et jardins. Planté en isolé, il pourra déployer sa large couronne. Taillé en rideau, il soulignera une allée par exemple (le tilleul supporte bien les tailles sévères).</p>	<p>floraison discrète mais délicatement parfumée au début de l'été.</p>	<p>Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, humifère, frais à humide.</p>	<p>TAILLE (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.</p>

ARBRES petite taille 12 - 20 m

Genre		Dimension	Feuillage et port	Floraison	Exposition	Entretien
ACER campestre Erable champêtre		H. 10 m L. 3 m	Feuillage caduque doré à l'automne. Petit arbre à port dense et arrondi		Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Soleil ou mi-ombre. Sol ordinaire, sec à modérément humide.	TAILLE (Janvier Novembre-Décembre) De la fin de l'automne au milieu de l'hiver, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
ACER carpiniifolium Erable à feuilla de charme		H. 9 m L: .9 m	feuillage marcescent Ce petit érable, souvent confondu avec le charme, a une large couronne arrondie		Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, humifère, sans trop de calcaire, frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.	TAILLE (Janvier Novembre-Décembre) De la fin de l'automne au milieu de l'hiver, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
ACER monspessulanum Erable de Montpellier		H.15m L.6/7m	Feuilles caduques trilobées luisantes vert foncé demeurant en place jusqu'à la fin de l'automne	Fruits rouges en grappes	Assez rustique, aime le fort ensoleillement. Résistant à la sécheresse, au vent et aux maladies. Il peut se développé en endroit sec et sol médiocre	TAILLE (Janvier Novembre-Décembre) De la fin de l'automne au milieu de l'hiver, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
AMELANCHIER canadensis Amélanchier		H. 5/6m L. 3/4m	Feuillage caduc Croissance extrêmement lente. Feuille simple. Très belle coloration en automne.	Au printemps fleurs blanches en étoile	Exposition au soleil ou mi-ombre. Sol sec de préférence.	TAILLE (Janvier-Février Décembre) Supprimer les rejets en hiver.

ARBRES petite taille 12 - 20 m

Genre		Dimension	Feuillage et port	Floraison	Exposition	Entretien
CRATAEGUS monogyna Aubepine		H: 10 m Diam: 8 m	Feuillage caduc. Arbre à couronne arrondie, épineux, à feuilles découpées	Corymbes plats de fleurs blanches à anthères roses, parfumées, suivies de fruits rouge foncé brillant en mai	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, même calcaire, sec à modérément humide.	TAILLE Se prête très bien à la taille en haie.

ARBUSTES

Genre		Dimension	Feuillage et port	Floraison	Exposition	Entretien
CORNUS sanguinea Cornouiller sanguin		H: 3 m L : 2.5 m	Arbuste à feuilles vertes devenant rouge en automne. Très belle couleur rouge orangé des jeunes pousses en hiver. Feuillage caduc	En début d'été, fleurs blanches en cymes applaties et denses.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, même calcaire, frais.	TAILLE (Février-Avril) Tailler toutes les branches en laissant 2 ou 3 yeux à la base .
CORYLUS avellana Noisetier commun		H: 6 m L : 5 m	Arbuste à bois souple. Feuilles larges Feuillage caduc	Chatons pendants jaunes en hiver. Noisettes sur les pousses de l'année précédente.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil. Sol ordinaire, pas trop sec à frais.	TAILLE (Juillet-Août) Tailler pour conserver un bon éclairage entre les branches en éliminant les gourmands du centre ou les branches faisant confusion.
EUCONYMUS europaeus Fusain d'Europe		H: 3 m L : 3 m	Caduc. Arbuste compact et buissonnant à feuilles devenant rouge en automne.	Discrète fleurs verdâtres Les fruits sont pourpre rougeâtre, renfermant une graine orange.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, humifère, pas trop sec à frais.	Taille (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
LIGUSTRUM ovalifolium Troène de californie		H: 4 m L : 2 m	Arbuste vigoureux et dense, semi-persistant, port dressé. Feuilles luisantes	A mi-été, grappes de petites fleurs blanches à odeur caractéristique, suivies de fruits noirs.	Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, pauvre, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.	Taille (Février-Avril, juillet-septembre) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.. Supporte bien les tailles répétées des haies

ARBUSTES

Genre		Dimension	Feuillage et port	Floraison	Exposition	Entretien
MESPILUS germanica Néflier		H: 5 m L: 8 m	Grand arbuste buissonnant étalé	le néflier est intéressant pour sa floraison en mai et ses curieux fruits comestibles	Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, même calcaire, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.	TAILLE Aucune taille n'influence sa fructification, le volume ou la qualité des fruits. On se contente d'éclaircir la ramure par quelques élagages de branches.
PRUNUS spinosa Épine noir		H: 4 m L: 4 m	Arbuste ou arbre buissonnant, épineux. Feuillage caduc	En Mars - Avril une multitude de fleurs en coupe blanche apparaissent avant les feuilles, suivies de fruits bleu noir, pruneux, comestibles, mais amers au goût. En mars - Avril	Exposition au soleil. Sol ordinaire, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.	Taille (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
ROSA canina Églantier		H: 3 m L: 3 m	Feuillage semi-persistant Port buissonnant	Très légèrement odorant, résistant, avec des fleurs simples, blanches ou roses, il conviendra pour toute scène paysagère naturelle.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil. Sol ordinaire, humifère, sans trop de calcaire, sec à modérément humide.	
SALIX purpurea 'Nana' Osier rouge nain		H: 1 m L: 1,5 m	Feuillage caduc Les rameaux de ce saule nain sont souvent teintés de rouge et ses chatons retombants sont vert argenté et pourpre. Idéal en haie basse.		Exposition au soleil. Sol lourd, pauvre, frais à humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C	Taille (Janvier - Mars) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.

ARBUSTES

Genre		Dimension	Feuillage et port	Floraison	Exposition	Entretien
SAMBUSCUS nigra Sureau noir		H: 6 m L: 6 m	Feuillage caduc Arbuste à rameaux à moelle blanche et à croissance rapide. Feuilles vertes à 5 ou 7 folioles, dégageant une odeur forte lorsqu'on les froisse.	En Juin-Juillet fleurs blanc crémeux en larges cymes terminales assez planes. Petits fruits rouges, puis noirs. Les oiseaux les apprécient beaucoup.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, même calcaire, sec à modérément humide.	Taille (Février-Avril) Avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.
VIBURNUM lantana Viorne cotonneuse		H: 5 m L: 4 m	Feuillage caduc Arbuste à feuilles vert-gris et cymes arrondies	En mai fleurs blanches, à étamines saillantes jaunes, suivies de grappes de fruits rouge vif, puis noirs.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, frais.	Taille (Février-Avril, Juillet-Aout)Après la floraison, tailler légèrement et supprimer les rameaux qui déséquilibrent le port de la plante
VIBURNUM opulus Viorne obier, boule de neige		H: 5 m L: 4 m	Feuillage caduc Vigoureux arbuste touffu. Feuilles lobées, vertes devenant rouge en automne.	En Mai-Juin cymes aplaties de fleurs blanches, suivies de gros fruits globuleux, rouge brillant. Prend bien sa place dans une haie champêtre.	Rustique, au moins jusqu'à -20°C. Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, sans trop de calcaire, frais.	Taille (Février-Avril, Juillet-Aout)Après la floraison, tailler légèrement et supprimer les rameaux qui déséquilibrent le port

